

対象疾患:肝がん

↓:投与日

レジメン名:ラムシルマブ単独療法

1コース: 14日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | ラムシルマブ注 | 8mg/kg | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

レジメン名:Low dose FP療法(導入)

1コース: 7日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シスプラチン注 | 10mg/body | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 2 | フルオロウラシル注 | 250mg/body | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |

レジメン名:Low dose FP療法(維持)

1コース: 7日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シスプラチン注 | 10mg/body | ↓ | | | | | | |
| 2 | フルオロウラシル注 | 250mg/body | ↓ | | | | | | |

(最終更新) 2020. 07

対象疾患:胆道がん

↓:投与日 →:投与

レジメン名: GEM療法

1コース: 28日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |

レジメン名: GEM+S-1療法

1コース: 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | S-1内服 | 1日2回 | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | |

レジメン名: GEM+CDDP療法

1コース: 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シスプラチン注 | 25 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

(最終更新) 2020.07

対象疾患: 膵がん

↓:投与日 →:投与

レジメン名: GEM療法

1コース: 28日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |

レジメン名: GEM+S-1療法

1コース: 21日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | S-1内服 | 1日2回 | | | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | |

レジメン名: nab-PTX+GEM療法

1コース: 28日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | パクリタキセル注 (アルブミン懸濁型) | 125 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |
| 2 | ゲムシタビン注 | 1000 mg/m ² | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | |

レジメン名: FOLFIRINOX療法

1コース: 14日間

| Rp | 処方 | 投与量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | オキサリプラチン注 | 85 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | イリノテカン注 | 180 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | レボホリナート注 | 200 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | フルオロウラシル注 | 400 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2400 mg/m ² | | | → | | | | | | | | | | | |